GALAXIAS

The image features the word "GALAXIAS" in a large, bold, 3D yellow font with a slight gradient and shadow, positioned diagonally across the upper half of the frame. The background is a deep space scene with a prominent spiral galaxy in shades of purple, blue, and white, set against a black field filled with numerous small, bright stars of various colors.

Imagens de galáxias $\neq$ estrelas
imagens das galáxias são mais difusas

estrela

Algumas são espirais como a nossa Galáxia e Andrômeda, outras não.

Aglomerado de Coma
~ 1000 galáxias
(100 Mpc de distância da Terra)
~326 Manos-luz

MORFOLOGIA: CLASSIFICAÇÃO DE HUBBLE

(classificação quanto à aparência)

Hubble fez esta classificação em 1924 usando o telescópio de 2.5 m do Mount Wilson

Atenção: não é um diagrama evolutivo

The background of the slide is a vast field of galaxies, likely from a deep space survey. The galaxies are scattered across the frame, appearing in various colors including yellow, orange, red, and blue. Some are bright and clear, while others are faint and distorted, possibly due to gravitational lensing. The overall appearance is that of a rich, multi-colored galaxy population.

**PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
DOS DIFERENTES TIPOS DE GALÁXIAS**

ESPIRAIS

- disco em rotação, braços de espirais e bojo
- densidade estelar maior concentrada no bojo
- halo extenso de estrelas velhas e de brilho fraco isoladas e em aglomerados globulares

Sa, Sb e Sc ⇒ classificação de acordo com tamanho do bojo

correlação bojo – braços de espirais

Galáxias Sa (bojos maiores)

espirais quase circulares e pouco delimitadas

Galáxias Sc (bojos menores)

**espirais mais espalhadas e mais definidas.
presença maior de “nós”
de matéria (estrelas + gás).**

- a maior parte da luz vinda das espirais $\Rightarrow$ estrelas A - G do disco
- braços de espirais $\Rightarrow$ estrelas O e B (coloração azulada)
- discos ricos em gás e poeira
- braços de espirais contém sítios de formação estelar recente e nuvens de gás e poeira mais densos

Tipo Sc contém mais gás e poeira, Sa contém menos

ESPIRAIS BARRADAS

galáxias espirais com a presença de uma barra alongada de gás e estrelas no bojo alongada de gás e estrelas no bojo

SBa, SBb e SBc $\Rightarrow$ classificação de acordo com tamanho do bojo

Braços de espirais projetam-se a partir da barra

Espirais normais e barradas têm as mesmas propriedades físicas e de composição química do gás e estrelas ⇒ difícil distinção entre os tipos

Talvez a nossa Galáxia seja barrada (SBb ou SBc)...

ELÍPTICAS

- sem estrutura espiral e sem disco
 - E0...E7 $\Rightarrow$ classificação quanto à elipticidade

- contém estrelas velhas
- praticamente sem formação estelar recente
- quantidade insignificante de gás (frio) interestelar

densidade de estrelas cresce da borda para o centro.

Estrelas com órbitas randômicas

ELÍPTICAS

a) M49

Type E2

(b) M84

Type E3

(c) M110

Type E5

- **elípticas gigantes:** diâmetro de n Mpc com 1 trilhão de estrelas
- **elípticas anãs:** diâmetro de ~ 1 kpc com poucos milhões de estrelas

**mais comuns
no universo**

**Comparação:
Nossa Galáxia: diâmetro ~ 30 kpc**

LENTICULARES

- Evidência de disco e bojo, pouco gás e sem estrutura espiral
 ↓
 constituído por estrelas velhas

(a) IC 335

Type S0

(b) NGC 4435

Type SB0

- **S0 = sem barra** **SB0 = com barra**

IRREGULARES

gás interestelar, estrelas jovens sem estrutura definida

intensa formação estelar

Contém $10^8 - 10^{10}$
estrelas

frequentemente encontram-se junto a galáxias maiores

Irr1

(a) NGC 4485/4490

Irr2

(b) M82

IRREGULARES

Galáxias Irr1

Small Magellanic Cloud

Large Magellanic Cloud

**Distância medida com Cefeidas:
50 kpc do centro da Galáxia**

	ESPIRAIS	ELÍPTICAS	IRREGULARES
Forma e estrutura	<p>Presença de um disco contendo braços de espirais.</p> <p>Presença de bojo.</p> <p>Presença de halos ~ esféricos</p> <p>Sa e SBa = maiores bojos e estrutura espiral menos definida.</p> <p>SB = presença de barras centrais contendo gás e estrelas</p>	<p>Estrelas distribuídas dentro de um volume elíptico</p> <p>E0= esférico</p> <p>E7= + alongado</p> <p>Densidade de estrelas maior no centro</p>	<p>Estrutura não óbvia</p> <p>Irr1= “espirais deformadas”</p> <p>Irr2= aparência explosiva</p>
Conteúdo estelar	<p>Disco = estrelas jovens e velhas</p> <p>Halo = estrelas velhas</p>	Estrelas velhas	Estrelas jovens e velhas
Gás e poeira	preferencialmente no disco	Halo de gás muito quente	Abundante em gás e poeira
Formação estelar	Formação nos braços de espirais	Formação recente insignificante	Alta taxa de formação
Dinâmica	<p>Disco = gás + estrelas movimentam-se em órbitas ~ circulares</p> <p>Halo e bojo = órbitas randômicas</p>	Estrelas com órbitas randômicas	Estrelas e gás com órbitas irregulares

ESTIMATIVA DA MASSA DAS GALÁXIAS

Curvas de rotação para várias galáxias espirais

$$M = \frac{Rv^2}{G} \text{ matéria escura!}$$

Massa de galáxias elípticas

$$M = \frac{3R\sigma^2}{G}$$

σ = dispersão de velocidades
 R = raio médio da galáxia

Obs: Fórmula diferente da massa estimada de galáxias espirais: $M=Rv^2/G \Rightarrow v$ = velocidade de rotação

MATÉRIA ESCURA

- **Outras galáxias também possuem matéria escura?**
- **Há evidência de matéria escura em maiores escalas?**

Galáxias espirais contém ~ 3 a 10 vezes mais massa do que é observado na forma de matéria visível

É verificada mais ou menos a mesma quantidade de matéria escura para galáxias elípticas também.

Galáxias estão imersas em halos de matéria escura

GALÁXIAS NORMAIS: $10^6 L_{\odot}$ (elípticas anãs e irregulares)
 $10^{12} L_{\odot}$ (elípticas gigantes)
nossa Galáxia: $2 \times 10^{10} L_{\odot}$

relativo a brilho

~ 40% das galáxias consideradas luminosas ($> 10^{10} L_{\odot}$)
NÃO SÃO “NORMAIS” !!!
PODEM SER BASTANTE LUMINOSAS

**São chamadas galáxias ativas
ou com núcleo ativo.**

Diferem das galáxias normais

- 1) Grande luminosidade**
- 2) tipo de radiação emitida.**

GALÁXIAS COM NÚCLEO ATIVO

Já a luminosidade das ativas **NÃO É** representada por uma curva de corpo negro. O pico de radiação é observado em λ bem maiores ou menores

Numa galáxia normal a luz emitida é a soma da luz das estrelas, portanto pode ser representada por um **CORPO NEGRO**.

A radiação vinda das galáxias ativas é chamada de RADIAÇÃO NÃO-TÉRMICA

GALÁXIAS DE NÚCLEO ATIVO = atividade energética ocorre ao redor do núcleo da galáxia.

GALÁXIAS DE NÚCLEO ATIVO são classificadas em 3 tipos:

- 1) Seyfert**
- 2) Radio-Galáxias**
- 3) Quasares**

Galáxias SEYFERT

Galáxias espirais com núcleos extremamente brilhantes

núcleo ~ 10,000 vezes mais brilhante do que o núcleo da nossa Galáxia (10 vezes mais do que a Via Láctea inteira)

(a)

(b)

Galáxias SEYFERT

Núcleos emitem radiação desde o infravermelho até raios-X
(75% emitem a maior parte da radiação no infravermelho)

Radiação de alta energia absorvida pela poeira pertencente ao núcleo
ou pertencente a regiões próximas ao núcleo e reemitida em IR

RÁDIO GALÁXIAS

Diferem das Seyfert por emitirem fortemente radiação na faixa de rádio e na aparência e extensão da região emissora.

Centaurus A

**Visível: galáxia E2 ou lenticular (500 kpc de diâmetro)
cortada por uma banda de poeira irregular**

RÁDIO GALÁXIAS

Possuem lóbulos de matéria (nuvens de gás arredondadas) invisíveis aos telescópios ópticos.

Tais lóbulos são perpendiculares ao plano da galáxia.

A energia em rádio é emitida através dos lóbulos!

RÁDIO GALÁXIAS

(a)

Imagem em raios X indica que as partes mais internas, próximas ao centro de origem dos jatos, emitem em alta energia

RÁDIO GALÁXIAS

Observadas a distâncias bem maiores do que as galáxias normais brilhantes

- associadas geralmente a galáxias elípticas

Energia do jato pode alcançar
 $\sim 10^{35}$ W
250 milhões $L_{\odot}$

Jatos podem alcançar
1 Mpc de extensão...

Cygnus A – 250 Mpc da Terra

Dependendo do ângulo pode-se ver os lóbulos ou não.

Blazar = quando observamos um lóbulos de frente

por efeito Doppler observamos a radiação na forma de raios-X ou gama

QUASARES

Quasi-stellar objects : aparência de estrela quando observados a baixos tempos de exposição, mas eram medidos espectros incomuns.

Depois observou-se que o espectro não era incomum e sim que as linhas espectrais eram enormemente deslocadas para o vermelho (redshift).

Indicativo que estes objetos podem encontrar-se a distâncias muito maiores do que todas as galáxias visíveis

**ULAS J1120+0641 , o quasar é observado tal como era há 770 milhões de anos após o big-bang .
Levou 12,9 bilhões de anos para que a luz emitida por ele nos alcançasse.**

Quasar 3C175
Lóbulos de 1Mpc de tamanho.

QUASARES TEM PROPRIEDADES PARECIDAS COM RÁDIO-GALÁXIAS

IMPORTANTE:

PODE REPRESENTAR UMA SEQUÊNCIA EVOLUTIVA:

QUASAR - GALÁXIAS ATIVAS (SEYFERT E RADIO) - GALÁXIAS NORMAIS

TEORIA MAIS ACEITA PARA EXPLICAR A ALTA LUMINOSIDADE, JATOS E LÓBULOS

Um buraco negro central supermassivo forma um disco de matéria ao seu redor, chamado disco de acreção. Nas galáxias ativas, o buraco negro central pode atingir bilhões de $M_{\odot}$.

A matéria neste disco (estrelas, gás e poeira interestelar) espirala em direção ao buraco negro, aquecendo e produzindo quantidade enorme de energia.

Radiação é produzida NA PARTE INTERNA DO DISCO DE ACRESÇÃO em raios γ e X, mas pode ser reprocessada nas nuvens densas de gás ao redor do buraco negro e reemitida em comprimentos de onda maiores.

Dependendo da linha de visada, pode-se observar a radiação vinda no núcleo em comprimentos de onda mais curtos ou mais longos

Radiação é “reprocessada” através do “donut” de gás e poeira que é a parte externa do disco de acreção.

Jatos de gás de alta velocidade são formados perpendicularmente ao disco de acreção, formando os LÓBULOS OBSERVADOS em radio galáxias e quasares.

Linhas de campo-magnético são estreitadas ao longo do jato. Partículas carregadas percorrem as linhas de campo magnético, produzindo também parte da radiação não-estelar observada.

Partículas carregadas emitem radiação synchrotron a medida que elas espiralam ao longo das linhas de campo magnético:

Radiação synchrotron neste caso é mais intensa a baixas frequências (radio) e não depende da T do objeto emissor (radiação não térmica).

GALÁXIA E GIGANTE NGC 4261

- a) Em amarelo imagem em rádio dos lobos (60 kpc de extensão)
- b) Evidência de um buraco negro no centro da rádiogaláxia $\Rightarrow$ disco de 100 pc de diâmetro ao redor de um material brilhante que possivelmente abriga um buraco negro.

ESTRUTURA EM GRANDE ESCALA: Distribuição das galáxias no universo

Galáxias não estão distribuídas uniformemente no espaço

Somente 20 ou 30 % das galáxias estão isoladas no espaço intergaláctico

Normalmente galáxias agrupam-se em:

- pares
- grupos (~ 1 Mpc de extensão, dezenas de galáxias)
- aglomerados ($\sim$ alguns Mpc e milhares de galáxias)
- super aglomerados ($\sim 50-100$ Mpc)

**massas vão de 10^{15} a $10^{16} M_{\odot}$
(aglomerados a super aglomerados)**

O que define grupos, aglomerados e super-aglomerados de galáxias é a força gravitacional que os mantém ligados.

Construção de um mapa 3D da estrutura do universo

Determinação precisa das distâncias

ESTENDENDO A ESCALA DE DISTÂNCIAS

Estimativa : ~ 40 bilhões de galáxias tão brilhantes quanto a nossa existem no universo observável.

Indicador de distância

VARIÁVEIS CEFÉIDAS

**Galáxia espiral M100
(16 Mpc)
Pertencente ao
aglomerado de Virgem**

GALÁXIAS ESPIRAIS: RELAÇÃO DE TULLY-FISHER

Galáxias muito distantes

$$\frac{\text{Alargamento}}{\lambda} = \frac{2 \times v_{rot}}{c}$$

velocidade de rotação $\Leftrightarrow$ luminosidade

$$L \propto v_{rot}^4$$

$$m - M = 5 \log D - 5$$

1. Estrela anã branca pertencente a um sistema binário cerrado recebe massa de sua companheira que se encontra no estágio de gigante
2. A estrela anã colapsa quando sua massa ultrapassa o limite de Chandrasekhar ($1,44 M_{\odot}$) (limite de uma estrela sustentada pela pressão de elétrons degenerados).

Quando a anã branca colapsa: sua T aumenta e começa haver a fusão do C em todos os pontos da estrela.

Mais próximo do centro: fusão de C e O $\Rightarrow$ formação de elementos do pico do ferro: ex. Mn, Cu, Zn, Co, Ni, Fe.

**A anã branca explode $\Rightarrow$
Carbon Detonation Supernovae**

**SN Ia não deixa
remanescente central**

SUPERNOVAS DE TIPO Ia

a “vela padrão” que vai a maiores distâncias

Curva de luz aproximadamente similar entre todas as SNIa independente da progenitora

Máximo de luminosidade $\sim 10^{11} L_{\odot}$

$$m - M = 5 \log D - 5$$

A nossa Galáxia forma um pequeno grupo com as suas satélites : **Nuvens de Magalhães, a elíptica anã Sagitário, outras elípticas anãs e irregulares anãs .**

O GRUPO LOCAL

Grupo Local consiste em:

Nossa Galáxia + Andrômeda + dezenas de galáxias menores

vermelho: elípticas anãs
azul: espirais
branco: irregulares

~ 50 galáxias no total

Andrômeda ⇔ Galáxia : 800 kpc

3 são espirais: nossa Galáxia + Andrômeda + M33
Outras: elípticas anãs (maior número) e irregulares anãs

Andrômeda e suas galáxias satélites

M32

Elíptica anã

M110

Elíptica anã

A próxima concentração de galáxias:

AGLOMERADO DE VIRGEM

- Contém $> \sim 3500$ galáxias
- 3 Mpc de dimensão

~ 18 Mpc da Galáxia

M86 e M87 são elípticas gigantes

Aglomerado Abell 1689

613 Mpc da MW
2,5 bilhões de
anos-luz

Espera-se que: galáxias em um aglomerado se movam de maneira randômica

Mas em maior escala : galáxias e aglomerados se movem de maneira ordenada.

A LEI DE HUBBLE

Vesto Slipher (1917) observou que numa amostra de 40 galáxias espirais, a maioria tinha espectros deslocados para o vermelho (movimento de afastamento (RECESSÃO) em relação à nossa Galáxia)

- O espectro medido da maior parte das galáxias, em todas as direções no céu, apresenta linhas com deslocamento para λ s maiores em relação ao λ em repouso (**REDSHIFT**).

$$\frac{\lambda_{obs} - \lambda_{lab}}{\lambda_{lab}} = \frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \frac{V}{c} \quad \Delta\lambda > 0$$

- Efeito observado em grandes escalas (distâncias)

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} \equiv Z \quad Z = \text{redshift}$$

Através do redshift mede-se v: DIAGRAMAS DE HUBBLE

A velocidade de afastamento de uma galáxia é $\propto$ à distância
 $\equiv$ lei de Hubble

vel. de recessão = $H_0 \times$ distância

Constante de Hubble

$H_0 = 71$ km/s/Mpc $\rightarrow$ a cada 1 Mpc a velocidade aumenta 71 km/s

incerteza de pelo menos 10%

incerteza estimada levando-se em conta todos os métodos de determinação de distância.

Redshifts até ~ 0,24

$\Rightarrow v \sim 71,000 \text{ km/s} : D \sim 1 \text{ Gpc}$

Usando todos os indicadores de distância

**Mapeamento do universo local
Aglomerados de aglomerados**

SUPERAGLOMERADOS

O SUPERAGLOMERADO LOCAL (superaglomerado de Virgem)

Tamanho total ~
40 -50 Mpc
Tamanho irregular e
alongado
 $10^{15} M_{\odot}$

Branco e amarelo =
regiões + densas

Verde e azul =
menos densas

Grupo Local pertence ao aglomerado de Virgem e se localiza na periferia do superaglomerado local.

muitos superaglomerados apresentam estruturas filamentosares ou paredes **(assinalado em vermelho na fig.)**

“Redshift Survey” com 1732 galáxias observadas do hemisfério norte. Vários pedaços profundos de céu de 6° de largura.

North
11,263 galaxies

South
12,434 galaxies

Survey com ~ 24.000 galáxias dentro de $4,5^\circ$ A 80° de céu.

Voids e filamentos medindo até 100 a 200 Mpc, nenhuma estrutura maior